

HYPNOSE[®]

05 SG



YEŞİL KURTTA GÜÇLÜ ETKİ

Etkili Madde : % 5 Emamectin benzoate

ETKİ ŞEKLİ

HYPNOSE 05 SG, yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup, sinir uyarılarını bloke eder. Böylece larvaların beslenmesi hemen durur ve paraliz şekillenir. HYPNOSE 05 SG, güçlü bir mide zehiridir ve kontak etkiye sahiptir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu Ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (Sera)	Pamuk Yaprak Kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 g / da, Larva	7 gün
Domates (Sera)	Yeşil Kurt (<i>Heliothis armigera</i>)	30 g / 100 L. su, Larva	7 gün
Bağ	Bağda Salkım Güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	25 g / 100 L. su, Larva	7 gün



Pamuk Yaprak Kurdu (*Spodoptera littoralis*)



Yeşil Kurt (*Heliothis armigera*)



Bağda Salkım Güvesi (*Lobesia botrana*)

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama aletinin memeleri kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

İLAÇLAMA ZAMANI

BİBER (Sera)

İlaçlama, 100 bitkide 1–2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4–5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan ilaçlama yapılmış olmalıdır.

DOMATES (Sera)

İlaçlama, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen mücadeleye başlanır.

BAĞ

Salkım Güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 °C' yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd' ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır. Her dölde bir ilaçlama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

HYPNOSE 05 SG' yi diğer ilaçlar ile karıştırarak kullanmayınız.



Üretici ve Pazarlayıcı Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.