



Sanspor[®]



Aktif Madde: 40 g/L Nicosulfuron
Süspansiyon Konsantre (SC)

**MISIR TARLALARINDA YILLIK VE ÇOK YILLIK YABANCI OTLARA KARŞI KULLANILAN
SELEKTİF HERBİSİT**

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 40 g/L Nicosulfuron
Süspansiyon Konsantre (SC)**

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu	Bekleme Süresi
MISIR	<p>ÇİMENŞİ OTLAR Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crusgalli</i>) Benekli Darıcan (<i>E. colonum</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Kirpi Darı (<i>Setaria viridis</i>)</p> <p>GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR Horozibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpek Üzüümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Pıtrak (<i>Xanthium strumarium</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)</p>	125 ml/da	30 gün

SANSPOR mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı, çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15–20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rhizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

Tatlı Mısır ve Cin Mısırdaki kullanmayınız.

Ayrıca, Ayırık (*Cynodon dactylon*) ve Topalak (*Cyperus sp.*) otlarını da baskı altında tutar. Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla karıştırıldığında etki artar (bromoxynil: 100 cc/da).

İLAÇLAMA ZAMANI

MISIR: 4 -8 yaprak arasında ilaçlamayı yapınız.

ÇİMENŞİ OTLAR: Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)

KANYAŞ: İlaç bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)

GENİŞ YAPRAKLI OTLAR: Gelişimlerin 2–6 yapraklı oldukları genç dönemleri

KULLANMA ŞEKLİ

- İlaç önce ayrı bir kap içinde suda eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10–40 lt.'dir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı arttırılmalıdır. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme (11003–11002) kullanılmalıdır.
- İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız.
- İlaçlamadan sonra 4–5 saat içinde yağış olmamalıdır.
- Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

MÜNEVEBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

SANSPOR uygulanan tarlalarda, 4 ay sonra sadece buğday, arpa ve soya fasulyesi; 10 ay sonra ise istenilen kültür bitkisi ekilebilir

KARIŞILIRLIK DURUMU:

SANSPOR, bromoxynil terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Organik fosforlu ilaçlarla karışmaz.



Sanspor Uygulanan Alan



Sanspor Uygulanmayan Alan



Ruhsat Sahibi Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114)
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.