

# Alecto® WG

Çift Etkili Mildiyö İlacı



**Süper İkili, Süper Koruma**

Etkili Madde : % 57 Metiram + % 4.8 Cymoxanil

# Alecto WG

## Çift Etkili Mildiyö İlacı

### “Süper İkili, Süper Koruma”

% 57 Metiram + % 4.8 Cymoxanil

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dönemi ve Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ	Mildiyö ( <i>Plasmopora viticola</i> )	200 g / 100 lt su	28 gün
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	200 g / da	21 gün
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	200 g / 100 lt su	21 gün
Kabakgiller (Hıyar, Kabak, Kavun)	Mildiyö ( <i>Pseudomonospora cubensis</i> )	200 g / 100 lt su	14 gün
Karpuz	Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	200 g / 100 lt su	14 gün



Bağda Mildiyö (*Plasmopora viticola*)



Patatestede Mildiyö (*Phytophthora infestans*)



Domates Mildiyö (Phytophthora infestans)



Hıyarda Mildiyö (*Pseudomonospora cubensis*)



Erken Yaprak Yanıklığı (*Alternaria Cucumerina*)

**Alecto® WG** % 57 Metiram ve % 4,8 Cymoxanil ihtiva eden sistemik ve kontakt etkili bir fungusittir.

#### ÖZELLİKLERİ

**Alecto® WG** çift etkilidir (Sistemik ve kontakt etkili). Uygulamadan itibaren 3 gün öncesinde bulaşmış olan hastalıkların gelişimini durdurur ve 10-12 gün süre ile yeni bulaşmalara karşı bitkiyi korur.

**Alecto® WG**, tedavi edici ve koruyucu etkiye sahiptir. Suda kolay eriyen ve tozmayan (WG) formülasyonu sayesinde etkisi mükemmel ve kullanıcıya emniyetlidir.

**Alecto® WG** yüksek kaliteli ve hastaliksız ürün elde etmenize yardımcı olur.

**Alecto® WG** güçlü antispörolant etkilidir.

**Alecto® WG** arılara zehirsizdir. Çiçeklenme zamanı kullanılabilir.

**Alecto® WG** IPM (Entegre Mücadele) programlarına uygundur.

**Alecto® WG** tavsiye edilen dozlarda kullanılan bitkilerde olumsuz bir etkisi yoktur.

Yağmurdan etkilenmez. (Uygulamadan sonra 1 saat sürenin geçmesi yeterlidir.)

#### ETKİ DURUMU

**Alecto® WG**, tatbikattan sonra 1 saat içinde yaprak yüzeyinde hızla yayılır ve yaprak içine hızlı bir şekilde girer. Hastalık sporlarının çimlenmesini durdurur ve ortamdaki mevcut sporları yok eder. Bununla beraber 3 gün öncesine kadar olan bulaşmış hastalık sporlarını yok ederek bitkiyi tedavi eder, diğer bir deyişle **Alecto® WG** tedavi edici özelliğede sahiptir.

#### KULLANIM ZAMANI

**Kabakgiller, Domates, Patates:** Genellikle ilaçlamalar koruyucu olarak veya en geç ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlamalar bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde olmalıdır.

**Bağ:** İlk ilaçlama sürgünler 25 – 30 cm. olduğunda, 15 gün aralıklarla ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır. Erken uyarı sisteminin olduğu yörelerde teknik teşkilatın yapacağı ilaçlama zamanı tavsiyelerine uyulmalıdır.

#### KARIŞILIRLIK

**Alecto® WG** yaygın olarak kullanılan fungusit ve insektisitlerle karıştırılabilir. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.



Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114  
Zehirlenme durumlarında arayınız.



Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.

HEM KORUYUCU  
HEMDE TEDAVİ EDİCİ

SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mah. 3. O. S. B. İhsandede Cad. 20. Sk. No : 35

Selçuklu / KONYA

Tel : 0.332. 239 14 60 - Fax : 0.332. 239 14 66

E-mail : info@safatarim.com Web : www.safatarim.com

SAFA TARIM

Ç-E  
TSE-ISO-EN  
14000

K - Q  
TSE-ISO-EN  
9000

TSE  
İSG-OHSAS  
TS 18001

TSE 17025