

SAFA TARIM

TOPZATE® EXTRA

FUNGIŞİT
(Mantar İlacı)

**% 4,2 Cymoxanil ile birlikte
% 39,75 Bakıroksiklorür
etkili maddelerini içeren
hem tedavi edici
hem de koruyucu
etkiye sahip mantar ilacı
Topzate Extra size üstün
koruma imkanı sunuyor.
Hem de WG (Suda Dağılabilir
Granül formülasyonu avantajı ile.**

**ÇİFT ETKİ
HEM
KORUYUCU
HEM DE
TEDAVİ EDİCİ**

**% 4,2 Cymoxanil+
% 39,75 Bakıroksiklorür
(% 40 metalik bakıra eşdeğer)**

SAFA TARIM



**ÇİFT ETKİ
HEM
KORUYUCU
HEM DE
TEDAVİ EDİCİ**

**% 4,2 Cymoxanil +
% 39,75 Bakıroksiklorür
(% 40 metalik bakıra eşdeğer)**

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ	Bağ Mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 g / 100 L su	21 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 g / 100 L su	7 gün
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	200 g / 100 L su	7 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kaptaki bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek yarısına kadar su konulmuş depoya karıştırılarak konur. Yine bir taraftan karıştırmaya devam edilerek kalan gerekli su miktarı ilave edilir. İlaçlı mahlûl, hazırlandığı gün içerisinde mutlaka kullanılmalıdır. Karıştırma işlemi ilaçlama sırasında devam etmelidir.

KULLANMA ZAMANI

Bağ: Bağlarda ilaçlamaya sürgünlerin 25–30 cm boya ulaştığı dönemde başlanır. Hastalığın seyrine ve şiddetine göre 10–12 gün aralıklarla devam edilir.

Domates: Domateste ilaçlamaya ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanır. Hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla devam edilir. İlaç koruyucu etki yanında tedavi edici özelliğe de sahiptir. İlaç bir sezonda 8 defadan fazla uygulanmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç birçok ilaçla karışabilir. Geniş çaplı uygulamalarda, fiziksel karışımın mümkün olup olmadığının anlaşılabilmesi için bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir. Ayrıca karışımın, kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği yapılacak küçük çapta bir karışımla da denenmelidir.



Bağ Mildiyösü
(*Plasmopara viticola*)



Mildiyö
(*Phytophthora infestans*)



Erken Yaprak Yanıklığı
(*Alternaria solani*)

İmalatçı ve Ruhsat Sahibi Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114)
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.