



**Bitki
Korumada
Süper
Teknoloji**

BYPASS® 240 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)
Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 gram Methoxyfenozide



İLACIN ÖZELLİKLERİ

- BYPASS 240 SC kelebek larvalarına karşı etkili bir ilaçtır.
- Mide yolu ile haşerelere etki eder.
- Solvent ihtiva etmez.
- Kullanıldığı ürünlere emniyetlidir.
- Polen taşıyıcılarına, predatör ve parazitoidlere karşı zararlı değildir.
- Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir.
- Sudaki canlılara orta derecede zehirlidir. Her türlü su kaynağına, akarsu ve göllere bulaştırılmamalı, ilacı mahlül dökülmemelidir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Pamuk	Pamuk Yaprak Kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	37.5 ml/da (2. ve 3. dönem larva)	21 gün
Bağ	Salkım Güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	40 ml/100 L su (larva, yumurta)	7 gün
Elma	Elma İç Kurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	60 ml/100 L su (larva)	14 gün
Domates (sera)	Pamuk Yaprak Kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	50 ml/ da (larva)	1 gün

KULLANMA ŞEKLİ

- Elma iç kurduna karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilacli bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döllere ait ilk ilaçlama zamanını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Birinci dölde karşı iki, ikinci dölde karşı bir olmak üzere üç ilaçlama yapılır.
- Bağda Salkım Güvesi için ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış başlanmaya başlaması, etkili sıcaklıklar toplamının birinci dölde 120 günderece, ikinci dölde 520 günderece, üçüncü dölde 1047 gündereceye ulaşması; fenolojik olarak birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde yumurta aranır ve yumurta açılımına göre ilaçlamaya karar verilir. Her dölde bir ilaçlama yapılır.
- Domateste (sera) pamuk yaprak kurduna karşı ilaçlama, yumurta paketlerinin bırakılması ve zararlıların çıkışı takip edilerek yapılmalıdır. Uygulama henüz yumurta paketleri açılmadan bitkilerin iç kısımları dahil ilaçlanmalıdır.
- İyi bir netice almak için tavsiye edilen dozda kullanılması şarttır.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- Ph' sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki ilacı üzeri dereceli ölçekle ölçüp, ayrı bir kaptaki bulamaç hazırladıktan sonra ilaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp, ilacı ekleyiniz. Karıştırıcı çalışırken ilaçlama aletinin geri kalanını su ile doldurunuz. İlaçlama esnasında ilacın devamlı karıştırılması veya karıştırıcının devamlı çalışması gereklidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlar ile karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur. Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.



Pamuk Yaprak Kurdu
(*Spodoptera littoralis*)



Salkım Güvesi
(*Lobesia botrana*)



Elma İç Kurdu
(*Cydia pomonella*)



Pamuk Yaprak Kurdu
(*Spodoptera littoralis*)

Ruhsat Sahibi Firma: SAFA TARIM A.Ş.



Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114)
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.