

CARPAZ®

50 WG

% 50 Cyprodinil

**Elma ve Kayısıda
Tam Koruma**



SAFA TARIM®



Suda Dağılabilen Granül (WG)
Fungisit (Mantar İlaç)
Aktif Madde Adı ve Miktarı : % 50 Cyprodinil

Elma ve Kayısıda Tam Koruma

CARPAZ 50 WG elmada karaleke; kayısıda çiçek monilyası hastalığına karşı kullanılan sistemik özellikleri sahip bir fungisittir. **CARPAZ 50 WG** elma ve kayısıda koruyucu ilaçlamalar şeklinde uygulanmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR			
Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
ELMA	Elma Karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	40 g/100 L su	28 Gün
KAYISI	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	30 g/100 L su	7 Gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka ilave edilir. İlaç su ile iyice karıştırıldıktan sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Kalibrasyon:

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki ağaçlar düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

Bitki tahammülü:

Tavsiyelere göre kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

UYGULAMA ZAMANI

Elma Karalekesi:

- ilaçlama: Tomurcukların kabardığı devrede,
- ilaçlama: pembe tomurcuk devresinde,
- ilaçlama : Çiçek taç yapraklarının % 70-80'i döküldüğü devrede

Kayısı Çiçek Monilyası:

- ilaçlama: çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),
- ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde (% 90-100 çiçekte)

UYGULAMA ŞEKLİ

İlaçlama meyvede tazyikli pülverizatörler ile ağaçların her tarafı ilaçlı mahlül ile temas edecek şekilde yapılmalı, ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına izin verilmemelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Genellikle, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet **CARPAZ 50 WG** başka ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ilacı suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz:

Önce **CARPAZ 50 WG** sonra karışıma giren diğer ilaç konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar "suda eriyebilir ambalaj" da bulunuyor ise önce bunlar, sonra **CARPAZ 50 WG** konur.



Elma Karalekesi (*Venturia inaequalis*)



Çiçek Monilyası (*Sclerotinia laxa*)

Üretici ve Pazarlayıcı Firma: SAFA TARIM A.Ş.



Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114)
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.