



CONRAD[®]
SC

SAFA TARIM[®]

ÖZELLİKLERİ

- CONRAD^{SC} geniş spektrumlu ve uzun süre etkili bir mantar ilacıdır.
- CONRAD^{SC} bitki üzerinde mükemmel sistemik etkisi ile tam koruma sağlar.
- CONRAD^{SC} spor çimlenmesini ve misel gelişimini engeller.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Bağ	Bağ Mildiyösü (<i>Plasmopara viticola</i>)	75 ml / 100 L. su	21 gün
	Külleleme (<i>Uncinula necator</i>)	75 ml / 100 L. su	21 gün
	Ölü Kol (<i>Phomopsis viticola</i>) (yaz ilaçlaması)	75 ml / 100 L. su	21 gün
Kabakgiller	Yalancı Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	60 ml / 100 L. su	3 gün
	Külleleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml / 100 L. su	3 gün
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	75 ml / 100 L. su	3 gün
	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	75 ml / 100 L. su	3 gün
Karpuz	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	75 ml / da	3 gün
Biber (Sera)	Külleleme (<i>Leveillula taurica</i>)	75ml / 100 L. su	3 gün
Çeltik	Çeltik Yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	100 ml/da	28 gün



Bağ Mildiyösü (*Plasmopara viticola*)



Külleleme (*Uncinula necator*)



Ölü Kol (*Phomopsis viticola*)



Yalancı Mildiyö (*Pseudoperonospora cubensis*)



Mildiyö (*Phytophthora infestans*)



Erken Yaprak Yanıklığı (*Alternaria cucumerina*)



Külleleme (*Leveillula taurica*)



Çeltik Yanıklığı (*Pyricularia oryzae*)

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Önce aletin deposunu yarısına kadar su ile doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra, gerekli miktar ilacı depoya ilave edin ve karıştırmaya devam ederek su seviyesini tamamlayın. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Bitkinin fenolojisine uygun olarak bir dekara kullanılacak su miktarı 40-100 litredir.

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ

Bağda Mildiyö: Sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığı devrede ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla, günlük ortalama sıcaklıklar 30 °C oluncaya kadar devam edilmelidir.

Bağda Külleleme: 1. ilaçlama henüz sürgünler 25-30 cm uzunluğundayken, 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde, 3. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilmelidir.

Bağda Ölükol (yaz ilaçlaması): 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama 8-10 cm, 3. ilaçlama ise 25-30 cm boyda iken yapılmalıdır. Bağda bir sezon içinde CONRAD SC ile ilaçlama sayısı 4'ü geçmemeli, 3'ten fazla üst üste kullanılmamalıdır.

Kabakgillerde Yalancı Mildiyö ve Külleleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Domateste (açıkta yetiştirilen) Mildiyö ve Erken Yaprak Yanıklığı: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı, 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Karpuzda Erken Yaprak Yanıklığı: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Biberde (Sera) Külleleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Sebzelere bir sezon içinde CONRAD SC ile yapılacak ilaçlama sayısı 4'ten fazla olmamalı; 2' den fazla üst üste kullanılmamalıdır.

Çeltikte Çeltik Yanıklığı: Hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama, 10 gün ara ile ikinci, gerekirse üçüncü ilaçlama yapılır.

Bitki tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, CONRAD SC ilacının tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

KARIŞILIRLIK DURUMU


CONRAD SC' nin domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Pirimiphos methyl, Pirimicarb, Lambda-cyhalothrin ve Chlorothalonil ile karıştırılabilir.



Ambalaj Tipi - Kolideki Adedi
200 ml * 40 adet
1L * 20 adet

Üretici ve Pazarlayıcı Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



ZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114)
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.