

KERNEL 50 W

% 50 Propyzamide

KÜSKÜT MÜCADELESİ'nde
ETKİLİ YÖNTEM!



KERNEL 50 W

% 50 Propyzamide

Kullanıldığı Bitki ve Yabancı Otlar

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i>) (<i>C. approximata</i>)	300 g / dekar yoncalar biçildikten sonra
Şeker Pancarı	Küsküt (<i>Cuscuta campestris</i>) (<i>C. approximata</i>)	300 - 400 g / dekar küskütler çimlendikten sonra pancara sarılmadan önce Şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken

İLACIN HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

KULLANMA ŞEKLİ

Önerilen dozda ilaç dekara 60-80 litre su ile atılmalıdır. Yoncada 2 ayrı zamanda uygulama yapılabilir.

1) Geç kış ilaçlaması:

Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil aksamın henüz püskürtülen ilacın toprak yüzeyine eşit dağılımını önleyecek kadar gelişmediği dönemde yapılan ilaçlamadır. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz ortalarına kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür.

2) İlk hasattan hemen sonra:

Ot hasadından hemen sonra yapılacak ilaçlama ile Ağustos ortalarına kadar küsküt filizlenmesi önlenmiş olur. Geç kış ilaçlamasından dekara 40 litre su, hasattan hemen sonra ise dekara en az 60 litre su ile atılması tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Ruhsat Sahibi ve İmalatçı Firma : SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.

