

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	% 60
Organik Karbon	% 12
Organik Azot (N)	% 4
Serbest Aminoasitler	% 13
pH Aralığı	4,5 – 6,5

UYARILAR

- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece Gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- ÇOCUKLARDAN ve GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: ithalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

KARIŞABİLİRLİK: Diğer bitki besleme ürünleri ve bitki koruma ürünleri ile karışımından emin olmak için ön karışım testi yapınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 / + 40 °C arasındadır.

Bakanlık Tescil No:

Bakanlık Lisans No: 130

Hacim:

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

İTHALATÇI FİRMA: SAFA TARIM A. Ş.

Büyükkayacak Mah. 20 Nolu Sok., No: 31 42250 Konya / TÜRKİYE

Tel: (0332) 239 14 60 pbx Fax: 0 (332) 239 14 66

ÜRETİCİ FİRMA: AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L.

Paraje Cerro De Los Lobos Edificio Maavi Innovation 04738 Vicar Almeria / İSPANYA

UYGULAMA ŞEKLİ ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	TOPRAKTAN UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA
Sebzeler: Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan, Fasulye vb.	4-6 Uygulama, Fide dikiminden itibaren sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Yaprağı yenen sebzeler: Marul, Kıvrıkcık, Lahana, Maydanoz, Roka vb.	2-3 Uygulama, Gelişim dönemi boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Meyve Ağaçları	2-4 Uygulama, sezon boyunca	0,5-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Bağ, Kivi	2-4 Uygulama, sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Narenciye, Zeytin	2-4 Uygulama, sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Pamuk	1-2 Uygulama	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Hububat: Arpa, Buğday, Çeltik vb.	1-2 Uygulama, kardeşlenme döneminden itibaren, başak tane dolumuna kadar	-	200-300 cc / da
Şeker Pancarı, Havuç	1-2 Uygulama, Tohum çimlenme döneminden sonra büyüme dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Patates	2-4 Uygulama, Çimlenme döneminden sonra büyüme dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Kavun - Karpuz	4-6 Uygulama, Fide dikiminden itibaren sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Ayçiçeği	1-2 Uygulama, Tohum çimlenme döneminden sonra büyüme dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Fındık, Ceviz, Badem	2-4 Uygulama, sezon boyunca	1,5-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Çilek	4-6 Uygulama, Şaşırtmadan itibaren sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Muz, Avokado, Mango	4-6 Uygulama, Gelişim dönemi boyunca	1,5-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Mısır	1-2 Uygulama, Tohum çimlenme döneminden sonra büyüme dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da
Süs Bitkileri	4-6 Uygulama, Fide dikiminden itibaren sezon boyunca	1-2 L / da	200-300 cc / 100 L
Soğan - Sarımsak	1-2 Uygulama, gelişim dönemi boyunca	0,5-1 L / da	200-300 cc / da

Yüksek karışabilirlik niteliği sayesinde HARMONY bitki besleme ve bitki koruma ürünleriyle kombinasyon stratejisi, her türlü üretim programına uyarlanabilir. Toprağın durumuna, bitkinin stres derecesine ve çevre koşullarına bağlı olarak tavsiye edilen doz maksimum seviyede uygulanabilir. Ancak, bitki besleme ve bitki koruma ürünleri ile kullanımında ön karışım testi yapılmasını tavsiye ederiz.