

İmal Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj No:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

**KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR:** Fare, Siçan mücadelesi.

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fare	Mesken veya mesken çevresinde çocukların ve hedef dışı canlıların ulaşamayacağı yerlere ve yem istasyonu içinde	3-5 m aralıklarla 1-2 adet	Ürünler tüketildikçe
Siçan		5-10 m aralıklarla 5-10 adet	

Her bir Pasta 10 gramdır.

#### KULLANMA ŞEKLİ:

**Lancet Pasta**, kullanıma hazır bir fare ve siçan zehiridir. Ürünün uygulama dozu mesken veya mesken çevresinde; yem istasyonları içerisinde fareler için 3-5 metre aralıklarla 1-2 pasta ve siçanlar için 5-10 metre aralıklarla 5-10 pastadır. Pastaların dışındaki kağıt çıkarılmamalıdır.

**Lancet Pasta**, EL DEĞMEDEN yem istasyonu içerisine konur. (Farelerdeki gelişmiş koku yeteneği nedeniyle, çıplak el teması mücadelenin etkinliğini düşürür. Eldiven veya poşet kullanılmalıdır.) Sonra, fare ve siçanların en çok tespit edildiği ve kolayca ulaşabileceği, fare dışıklarının görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirilir.

Fare ve siçanlar tükettikleri ürünü kanama sebebiyle ölürlür.

İstasyonlardaki yem haftada bir kontrol edilmeli, azalmış ise yenisi ile değiştirilmelidir. Fare ve siçan aktivitesi bitene kadar devam edilmelidir.

#### ÜRETİCİ FİRMA:

ACT

La Poste Française BP 258 AD 500 Andorra La Vella, D. KENTAL KİRENCİ Mesat Tarım A.Ş. SAFATARIM

#### RUHSAT SAHİBİ ve DOLUM YERİ:

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31

Selçuklu / KONYA

Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66 <http://www.safatarim.com>

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31

Tel : 0.332.239 14 60 Fax : 0.332.239 14 66

Selçuklu V.D. / 05.0107 65 / Selçuklu / KONYA

Paketlenen ürün miktarı: 100 g (10 x 10 g), 250 g (25 x 10 g), 500 g (50 x 10g), 1 kg (100 x 10 g), 2 kg (200 x 10 g), 2,5 kg (250 x 10 g), 3 kg (300 x 10 g), 5 kg (500 x 10 g), 7,5 kg (750 x 10 g), 8 kg (800 x 10 g), 10 kg (1000 x 10 g), 20 kg (2000 x 10 g), 25 kg (2500 x 10 g)

(Bulk ithalatı ambalajı miktarı 10 kg'dır.)

Ambalaj açılmış ürünü 30 gün içerisinde kullanınız.

Ürünün normal (25±2 °C) depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU:  
UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE  
PROSEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

SAFA TARIM A.Ş.



## LANCET PASTA

Formülasyon şekli:

Mavi Pasta

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%):

% 0.005 Difenacoum

3-[3-(1,1'-biphenyl)-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one;  
CAS: 56073-07-5

Yardımcı maddeler ve miktarları(%):

% 0.005 Denatonium Benzoate

% 100'ü tamamlayan ölçüde dolgu maddeleri

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE

GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,

SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE

RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha

edilmelidir.

ÜRÜN TİPİ (14)  
RODENTİSİT

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Belirtilere ortaya çıkması gecikebilir. Üründeki pıhtılaşmayı baskılayan madde nedeniyle zehirlenme belirtileri genellikle kanama ile ilgilidir. Bu belirtilerden bazıları, burun kanaması, tükürükte kan, idrarda kan, ciltte morartılar, dışkıda siyahılık veya kan, karın ve çevresinde ağrıdır.

Difenacoum Akut Oral LD<sub>50</sub>(siçan): 1.8 mg/kg

#### İlk Yardım önlemleri

**Genel bilgi:** Ürün içerisindeki aktif madde bir antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) maddedir. Antivitamin K antikoagülan etkisi bulunmaktadır ve bu etki zaman zaman devam edebilir. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Ürünün etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

**Soluma:** Kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın.

**Yutma:** Hemen tıbbi yardım alın. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

**Cilt teması:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**Göz teması:** Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

#### Antidotu ve gerekli bilgiler

Antidodu vitamin K1'dir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN  
114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKYEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

• Kullanmadan önce etiketi okuyun.

• HER TÜRLÜ TEMASTAN KAÇININ!

• Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı bir yerde 25±2 °C'de muhafaza ediniz. Gübre, su, gıda ve yemlerden uzak tutunuz.

• Arılar için zehirlidir.

• Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

#### ZARARLILIK İŞARETİ:



#### UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmasından elleçlemeyin.

P260 Tozunu solumayın.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P308+P313 Maruz kalıma veya etkileşime halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.

P405 Kilitli alınında saklayın.

P501 İçeriği kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

İlave etiket bilgileri

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

09 Ekim 2019



İmal Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj No:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

**KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR:** Fare mücadelesi.

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	İstasyon İçerisinde Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fare	Mesken veya mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde dayanıklı istasyon içerisinde	20 g, 30 g, 40 g, 50 g	Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilmeli, aktivite devam ediyorşa uygulama tekrarlanmalı.

Her bir Pasta 10 gramdır.

#### KULLANMA ŞEKLİ:

**Lancet Pasta**, kullanıma hazır bir fare zehiridir. Mesken veya mesken çevresinde, tabloda belirtildiği şekilde tek kullanımlık istasyonlar halinde kullanılır.

**Lancet Pasta**, eldiven kullanılarak, farelerin en çok tespit edildiği ve kolayca ulaşabileceği, fare dışlarının görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirilir.

Fareler tükettikleri ürünle kanama sebebiyle ölürler. Fare aktivitesi bitene kadar uygulamaya devam edilmelidir.

#### ÜRETİCİ FİRMA:

**ACT**  
La Poste Française BP 258 AD 500 Andorra La Vella,  
ANDORRA PRENSLİĞİ

**Ph. D. Kemal KESENCİ**  
Mevcut Müdür  
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31  
Tel : 0 332 239 14 60 / Fax : 0 332 239 14 66  
Selçuk Y. 1739 007 66 46 / Selçuklu / KONYA

#### RUHSAT SAHİBİ ve DOLUM YERİ:

**SAFA TARIM A.Ş.**  
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31  
Selçuklu / KONYA  
Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66 <http://www.safatarim.com>

Tek kullanımlık istasyon içine paketlenen ürün miktarı:

20 g, 30 g, 40 g, 50 g  
(Bulk ithalatı ambalajı miktarı 10 kg'dır.)

Ambalaj açılmış ürünü 30 gün içerisinde kullanınız.

Ürünün normal (25±2 °C) depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

**KULLANICI GRUBU:**  
GENEL HALK

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ**

**SAFA TARIM A.Ş.**



# LANCET PASTA

Formülasyon şekli:  
Mavi Pasta

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (% a/a):

% 0.005 Difenacumol  
3-[β-(1,1'-biphenyl)-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one;  
CAS: 56073-07-5

Yardımcı maddeler ve miktarları (% a/a):

% 0.005 Denatonium Benzoate  
% 100'ü tamamlayan ölçüde dolgu maddeleri

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR Veya ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ,**

**SİĞARA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE**

**RİSKLERİ**

**ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA**

**UYUNUZ.**

**Boş ambalaj imha şekli:**

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

**ÜRÜN TİPİ (14)**  
RODENTİSİT

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. Üründeki pıhtılaşmayı baskılayan madde nedeniyle zehirlenme belirtileri genellikle kanama ile ilgilidir. Bu belirtilerden bazıları, burun kanaması, tükürükte kan, idrarda kan, ciltte morartılar, dışkıda siyahılık veya kan, karın ve çevresinde ağrıdır.

Difenacumol Akut Oral LD<sub>50</sub>(siçan): 1.8 mg/kg

#### İkyardım önlemleri

**Genel bilgi:** Ürün içerisindeki aktif madde bir antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) maddedir. Antivitamin K antikoagülan etkisi bulunmaktadır ve bu etki zaman zaman devam edebilir. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Ürünün etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

**Solunma:** Kisiyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın.

**Yutma:** Hemen tıbbi yardım alın. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

**Cilt teması:** Kirilenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

**Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.**

**Göz teması:** Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

#### Antidotu ve gerekli bilgiler

Antidotu vitamin K1'dir.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- **HER TÜRLÜ TEMASTAN KAÇININ!**
- Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı bir yerde 25±2 °C'de muhafaza ediniz. Gübre, su, gıda ve yemlerden uzak tutunuz.
- Arılar için zehirlidir.
- Bitkilere ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

#### ZARARLILIK İŞARETİ:



#### UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

**H360D** Doğmamış çocuktan hasara yol açabilir.

**H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

**P201** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

**P202** Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

**P260** Tozunu solumayın.

**P280** Koruyucu eldiven kullanın.

**P308+P313** Maruz kalıma veya etkileşime halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

**P314** Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.

**P406** Kilit altında saklayın.

**P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**EUH001** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



İmal Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Sarıj No:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

**KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR:** Sıçan mücadelesi.

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	İstasyon İçerisinde Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Sıçan	Mesken veya mesken çevresi Tek kullanımlık ve dökülmeyecek şekilde dayanıklı istasyon içerisinde	50 g, 100 g, 150 g	Periyodik aralıklarla istasyonlar kontrol edilmeli, aktivite devam ediyorsa uygulama tekrarlanmalı.

Her bir Pasta 10 gramdır.

#### KULLANMA ŞEKLİ:

**Lancet Pasta**, kullanıma hazır bir sıçan zehiridir. Mesken veya mesken çevresinde, tabloda belirtildiği şekilde tek kullanımlık istasyonlar halinde kullanılır.  
**Lancet Pasta**, eidiven kullanılarak, sıçanların en çok tespit edildiği ve kolayca ulaşabileceği, sıçan dışıklarının görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına yerleştirilir.  
Sıçanlar tükettikleri ürünle kanama hasarına sebebiyle ölürler. Sıçan aktivitesi bitene kadar uygulamaya devam edilmelidir.

#### ÜRETİCİ FİRMA:

**ACT**  
La Poste Française BP 258 AD 500 Andorra La Vella, **MESKENLİĞİ**  
ANDORRA PRENSLİĞİ  
**Ph. D. Kema KESENCİ**  
Büyükkayacık Mahallesi 20 Nolu Sokak No:31  
Tel : 0 332 239 14 60 / Fax : 0 332 239 14 66  
Selçuk V.Ş. / 736 007 65 46 / Selçuklu / KONYA

#### RUHSAT SAHİBİ ve DOLUM YERİ:

**SAFA TARIM A.Ş.**  
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31  
Selçuklu / KONYA  
Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66 <http://www.safatarim.com>

Tek kullanımlık istasyon içine paketlenen ürün miktarı:

50 g, 100 g, 150 g  
(Bulk ithalatı ambalaj miktan 10 kg'dır.)

Ambalaj açılmış ürünü 30 gün içerisinde kullanınız.

Ürünün normal (25±2 °C) depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

**KULLANICI GRUBU:**  
GENEL HALK

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ**

SAFA TARIM A.Ş.



## LANCET PASTA

Formülasyon şekli:  
**Mavi Pasta**

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (% a/a):

% 0.005 Difenacoum  
3-[β-(1,1'-biphenyl)-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one;  
CAS: 56073-07-5

Yardımcı maddeler ve miktarları (% a/a):

% 0.005 Denatonium Benzoate  
% 100'ü tamamlayan diğer dolgu maddeleri

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE**

**GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ,**

**SİĞARA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE**

**RİSKLERİ**

**ÖNLEM İÇİN, KULLANIM TALİMATINA**

**UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

**ÜRÜN TİPİ (14)**  
RODENTİSİT

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. Üründeki pıhtılaşmayı baskılayan madde nedeniyle zehirlenme belirtileri genellikle kanama ile ilgilidir. Bu belirtilerden bazıları, burun kanaması, tükürükte kan, idrarda kan, ciltte morartılar, dışkıda sıyahılık veya kan, karın ve çevresinde ağrıdır.

Difenacoum Akut Oral LD<sub>50</sub>(sıçan): 1.8 mg/kg

#### İlk Yardım önlemleri

**Genel bilgi:** Ürün içerisindeki aktif madde bir antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyen) maddedir. Antivitamin K antikoagülan etkisi bulunmaktadır ve bu etki zaman zaman devam edebilir. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Ürünün etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

**Solutma:** Kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın.

**Yutma:** Hemen tıbbi yardım alın. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

**Cilt teması:** Kirilenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

**Göz teması:** Hemen bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**Antidotu ve gerekli bilgiler**

Antidotu vitamin K1'dir.

#### ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN

114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

• Kullanmadan önce etiketi okuyun.

• Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı bir yerde 25±2 °C'de muhafaza ediniz. Gübre, su, gıda ve yemlerden uzak tutunuz.

• Arılar için zehirlidir.

• Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

**ZARARLILIK İŞARETİ:**

**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ:**

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P260 Tozunu solumayın

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P308+P313 Maruz kalıma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

