

EMPOWER®



SAFA TARIM®

**ÇIKIŞ SONRASI
DAR VE GENİŞ YAPRAKLI
YABANCI OT MÜCADELESİNDE
GÜÇLÜ KONTROL**

Süspansiyon
Konsantre (SC)
Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Madde:

75 g/L Mesotrione + 30 g/L Nicosulfuron

Cin mısırında ve tatlı mısırda kullanılmaz!

EMPOWER®



Süspansiyon Konsantre (SC)

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

Aktif Madde: 75 g/L Mesotrione + 30 g/L Nicosulfuron

Grubu

F2,27; B,2

Herbisit

ÖZELLİKLERİ:

EMPOWER, mısır tarlalarındaki dar ve geniş yapraklı yabancı otları başarıyla kontrol eden, 'mesotrione ve nicosulfuron' etkili maddelerini süspansiyon konsantre formülasyonda ihtiva eden seçici bir yabancı ot ilacıdır. **EMPOWER**, esas itibarıyla yeşil aksamdan (yaprak, gövde) alınır, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) süratle taşınır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Mısır	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semiz Otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Ebegümeçi (<i>Malva sylvestris</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) İmam Pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Domuz Pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	200 ml /da Çıkış sonrası

* Cin mısırında ve tatlı mısırda kullanılmaz.

KULLANIM ŞEKLİ:

Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir ancak en geç uygulama zamanı mısırın 8 yapraklı olduğu dönemdir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütüküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları gece ve gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir.

DİKKAT:

-Uygulama sırasında ilacın rüzgar ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meyve alanlarına taşınması engellenmelidir. **EMPOWER**, organik fosforlu bir toprak ilacının kullanıldığı durumlarda uygulanmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea' li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı, ve bu grup bileşiklerle ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yeni ilaçlanmış alanlara otlatma için hayvan sokulmamalı, bu alanlardan ot alınmamalıdır.

Münavebe ve tekrar ekim: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise ardından tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok az da olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi bir toprak sürümü tavsiye edilmelidir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemeden sonra kışık buğday ve arpa ekilebilir. Şeker pancarı ve ayçiçeği gibi hassas bitkilerde bekleme süresine ve toprağın yağmur almasına özen gösterilmelidir.

DİKKAT:

Şekerpancari, bezelye ve bakla ekimi **EMPOWER** uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemeden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancari ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer ilaçlarla tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır. Organik fosforlu ilaçlarla karıştırmayınız. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea'li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalıdır.



Domuz Pitrağı
(*Xanthium strumarium*)



Ebegümeçi (*Malva sylvestris*)



Darıcan
(*Echinochloa crus-galli*)



İmam Pamuğu
(*Abutilon theophrastii*)



Ambalaj Şekli:
1 L * 20 adet

Ruhsat Sahibi Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com

SAFA TARIM



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.

TS EN ISO / IEC 17025