

Üretim Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj No:  
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Hamamböceği (Ergin)	Kapalı Alan	m <sup>2</sup> 'ye 3 damla (0,258 g)	Rezidüel etkili (Laboratuvar koşullarında 21 gün etkin bulunmuştur).
Karıncı (Ergin)	Şırınga ile uygulama	m <sup>2</sup> 'ye 1 damla (0,086 g)	Rezidüel etkili (Laboratuvar koşullarında 7 gün etkin bulunmuştur).

#### Kullanma şekli:

**MaxGel**, hamamböceği ve karınca mücadelesine karşı, şırınga ile uygulanan kullanıma hazır jel yemdir. Uygulama için tüpün kapağı açılır ve arkasından bastırılır.

**MaxGel**, hamamböceği ve karınca çıkışlarının gözlemlendiği, bulunma oranlarının yüksek olduğu alanlara veya yakınlıklarına uygulanır. En iyi sonuç için, öncelikle uygulama yapılacak uygun yerler tespit edilir ve bu alanlar temizlenerek (diğer yiyecek kaynakları uzaklaştırılarak) uygulamaya hazırlanır. Ardından uygulama yapılır. İstenmeyen alana bulanan jel, sünger ve % 5 lik Sodyum Klorür ile temizlenir.

**MaxGel** zararlinin görüldüğü alanlara tablodaki doza uygun olarak, küçük damlalar şeklinde uygulanır. 0,258 g (3 damla), toplam 13-16 mm çaplı damlaya ve 0,086 g (1 damla), toplam 8-10 mm lik damlaya denktir). Jel damlaları karanlık köşeler, duvar çatlakları, dolap ve raf arkaları, mutfak tezgâhlarının altı, elektrik kontrol kutuları, banyo teçhizatlarının alt tarafları, su tahliye boruları gibi alanlara uygulanır. Spreyleme yapılımasının uygun olmadığı ya da zor olduğu sürekl kullanılm alanlarında (gıda üretim tesisi, hastane, otel, belediye, hamam, sinema, okul, restoran vb.) kolayca uygulanabilir.

**MaxGel**'i rutin temizliklerde silinecek yerlerde uygulanmamalıdır. Hamamböcekleri veya karıncanın jeli yemekten vazgeçebilecekleri göz önüne alınarak, **MaxGel** damlaları üzerine veya çevresine diğer insektisitlerle ilaçlama yapılmamalı veya yeni insektisit uygulanmış yerlere uygulama yapılmamalı. Zararlı istilası ciddi boyutlarda ise, uygulanan yem yenildiği halde hala canlı zararlı var ise veya zararlı popülasyonu artış gösteriyor ise, uygulama tekrarlanabilir.

Net: 5, 10, 15, 20, 25 30, 35, 50, 100, 150, 200 gram  
Ambalaj açılmış ürün 3 ay içerisinde kullanılır.  
Ürünün raf ömrü 25±2°C'de 2 (iki) yıldır.

Üretici ve Ruhsat sahibi firma: **SAFA TARIM A.Ş.**  
Büyükkayacık Mahallesi, 20 Nolu Sokak No: 31 Selçuklu / KONYA  
Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66  
<http://www.safatarim.com>

Ph. D. Kemal KESENCI  
Müşteri Müdürü  
SAFA TARIM A.Ş.  
Sırt Üstü 20 Nolu Sokak No:31  
Büyükkayacık Mahallesi  
Tel: 0332 239 14 60  
Fax: 0332 239 14 66  
Selçuklu / KONYA

KULLANICI GRUBU  
(GENEL HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve  
PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

SAFA TARIM A.Ş.



MaxGel

Formülasyon Şekli: Jel

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%):

% 2,15 İmidacloprid (saf)

((2E)-1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinone; CAS No: 138261-41-3)

Yardımcı maddeler ve miktarları:

%15,5 cezbetici, %0,5 kıvam artırıcı, %0,5 jelleştirici,

%5 antifoam, %0,05 stabilizatör, %0,03 tiksindirici

(Bitrex), %76,27 dolgu maddesi

ÇOCUKLARDAN, GIDA ve HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUÇU ELBİSE, EL DİVEN VE

GÖZLÜK KULLANINIZ

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇ BİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA

KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanılmayınız.

ÜRÜN TİPİ (18)  
İNSEKTİSİT

LD50 değerleri	imidacloprid
Akut oral, LD50 Sıçanı:	380-650 mg/kg
Akut dermal, LD50, sıçanı:	> 5000 mg/kg

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi ile titreme, daha ileri durumda uyuşukluk veya çarpınma.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**GENEL BİLGİ:** Etkileri gecikebilir. Etkilenen kişiyi gözlem altında tutun.

**SOLUMA:** Soluma ile maruziyet görülmeyen. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

**YUTMA:** Hemen tıbbi yardım alın. Kişiyi kusturmaya çalışmayınız. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

**CİLT TEMASı:** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın.

Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**GÖZ TEMASı:** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Göz kapaklarının altı dahil olmak üzere, en az 15 dakika bol suyla gözleri yıkayınız. Hemen tıbbi yardım alın.

**Antidodu ve Tedavisi:**

Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
- Anılar için zehirlidir.

**RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

**GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:**


P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EU407 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**TEHLİKE SEMBOLÜ:**



10 Temmuz 2017

Handwritten signature and initials