



ACTIVIZIM®

50 EC

İNSEKTİSİT (Böcek ilaçı)

Litrede 500 gram pirimiphos-methyl

Pamuk, Sebze ve Boş Ambar İlaçlamasında
Aradığınız Kalite



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİLER	ZARARLILAR	DOZU	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Pamuk	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	200 ml/da Larva, ergin	3 gün
Sebze	Beyaz Sinek (<i>Bemisia tabaci</i>) Lahana Yaprak Güvesi (<i>Plutella maculipennis</i>) Yaprak Bitleri (<i>Aphis spp.</i>) (Fasulye, Domates ve Hıyar)	200 ml/da Larva 150 ml/da Larva 100 ml/100 l. su nimf, ergin	3 gün 3 gün 3 gün
Boş Ambar İlaçlaması	Patates Güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>) Buğday Biti (<i>Sitophilus oryzae</i>) Baklagil Tohum Böcekleri (<i>Bruchus spp.</i>) Kuru Meyve Güvesi (<i>Plodia interpunctella</i>) Arpa Güvesi (<i>Sitotraga cerealella</i>) Kırma Biti (<i>Tribolium confusum</i>) Pirinç Biti (<i>Sitophilus oryzae</i>)	300 ml/100 m ²	--

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisinde karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın islatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır.

ACTİVİZİM 50 EC'nin mide ve temas yoluyla etkisinin yanında kuvvetli bir fumigant etkisi de vardır. Sırt atomizörleri, sırt tulumbaları, traktöre monte edilebilen pülverizatörlerle tatbik edilebilir. Hava sıcaklığının 32 °C' nin üzerinde olduğu durumlar uçak ile ilaçlama için uygun değildir. Atomizörle yapılacak ilaçlamalarda aletin ilaç deposunun kapasitesi dikkate alınarak, normale göre 4 misli daha fazla ilaç konmalıdır. Boş ambarların dezenfeksiyonunda ambarlar iyice süpürülüp, temizlendikten sonra tavan, taban dâhil bütün satılıklar iyice ilaçlanmalıdır. Tarlada yapılacak olan ilaçlamalar zararının durumuna göre 7–14 günde bir tekrarlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ACTİVİZİM 50 EC ilaçı birçok insektisit ve fungisitle karışabilirse de büyük miktarlarda karışımalar hazırlanmadan önce basit karışım testleri yapılması tavsiye edilir.



Beyaz Sinek (*Bemisia tabaci*)



Lahana Yaprak Güvesi (*Plutella maculipennis*)



Yaprak Bitleri (*Aphis spp.*)



Baklagil Tohum Böcekleri (*Bruchus spp.*)



Kuru Meyve Güvesi (*Plodia interpunctella*)



Kırma Biti (*Tribolium confusum*)



Arpa Güvesi (*Sitotraga cerealella*)




Patates Güvesi (*Phthorimaea operculella*)



Pirinç Biti (*Sitophilus oryzae*)

Üretici ve Pazarlayıcı Firma: SAFA TARIM A.Ş.

Kayaklı Mh. 3. O.S.B. İhsandede Cd.
20. Sk. No: 35 KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114
Zehirlenme Durumlarında arayınız.

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.