

Tagiant 30 L

Litrede 360 gram Hymexazol

DOMATES, TÜTÜN VE MUZ'DA TOPRAK KÖKENLİ HASTALIKLARA KARŞI LİDER FUNGİSİT



Tagiant 30 L

Litrede 360 gram Hymexazol

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu
Domates	Çökerten (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>)	150 ml / 100 L. su (3 Litre / m ² mahlül)
Tütün	Çökerten (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>)	150 ml / 100 L. su (3 Litre / m ² mahlül)
Muz (Sera)	Fusarium Solgunluğu (<i>Fusarium oxysporium</i> , <i>F. sp. cubense</i>)	70 ml /da

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kaptan az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

KULLANMA ŞEKLİ

Tohum ekiminden hemen sonra m²,ye 3 litre mahlül gelecek şekilde süzgeçli kova veya pülverizatör ile toprak yüzeyine uygulanır.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Carbofuran'ın kimyasal modifiyeleri, benfuracarb, carbosulfan ve urathiocarb terkipli ilaçlar hariç yaygın insektisitlerle karışabilir.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FIRMA

SAFA TARIM A.Ş.

Kayacık Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Caddesi 20. Sokak No:35
Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 14 60 - Fax: 0.332 239 14 66
Web: www.safatarim.com - E-mail: info@safatarim.com




Çökerten (*Fusarium spp.*)



Çökerten (*Pythium spp.*)



Çökerten (*Fusarium spp.*)



Çökerten (*Pythium spp.*)



Daha İyi Tarım İçin İdeal Ortanız...