

Smilodon®

Yazlık Yağ
İnsektisit-Akarisit (Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)
Litrede 800 gram Parafinik Yağ

Tarunçgil
Kırmızı
Kabuklu
Biti

Dut
Kabuklu
Biti

Diğer Yağlar

Smilodon

DAHA KÜÇÜK ZERRECİKLER,
DAHA ETKİN MÜCADELE


Armut
Psillidi

Kırmızı
Örümcek

SAFA TARIM®

ÖZELLİKLERİ:

- Parafinik hidrokarbon sayısının yüksek olması nedeniyle partikül büyüklüğü küçüktür. Bu sayede bitkilerde fitotoksiteye neden olmadan en yüksek oranda etkinlik sağlanır.
- YAĞ AYRIŞMASI GÖRÜLMEZ
- Kullanıcılar ve çevre için son derece emniyetlidir.
- Entegre mücadele programlarına uygundur.
- Arılara, balıklara ve yararlı organizmalara uygundur.
- Tek başına kullanılmalıdır.
- Yağ uygulamasını izleyen 20 gün içinde captan, kükürt ve folpet ihtiva eden ilaçlar kesinlikle kullanılmaz.
- **Smilodon**, bitkide birikmediği için ihtiyaç duyulduğunda 7-8 gün aralıklarla bile kullanılabilir.
- Erginlerin yumurta bırakmasını engelleyerek popülasyonun azalmasını sağlar.



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu
Turunçgiller	Turunçgil Kırmızı Kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>)	1500 ml/100 L su
Armut	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1500 ml/100 L su
Şeftali	Dut Kabuklubiti (<i>Pseudolacaspis pentagona</i>)	3000 ml/100 L su
Hıyar (sera)	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	800 ml/100 L su

UYGULAMA ZAMANI:

Turunçgil Kırmızı Kabuklubiti:

Yapılan yaprak kontrollerinde yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf 0,5'ten fazlaysa, meyve kontrollerinde ise %15 meyve bulaşıklığı (bir kabuklu bit bulunsa bile meyve bulaşık kabul edilir) varsa ilaçlama yapılır.

Armut Psillidi:

Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2. ve 3. dönem nimflerin görülmeye başlandığında ilaçlama yapılır. İhtiyaç duyulduğunda yaz ilaçlamaları yapılabilir.

Şeftali Dut Kabuklubiti:

Çiçeklerin açılmasından 2-3 hafta önce uygulanmalıdır. Ancak gerekli hallerde tomurcukların açılmasından birkaç gün öncesine (pembe tomurcuk) kadar ilaçlama yapılabilir.

Hıyar(sera) Kırmızı Örümcek:

Yapılan sayımlarda yaprak başına 3-5 adet canlı kırmızı örümcek isabet ederse mücadeleye karar verilir. Tek uygulama yeterlidir.

ÖNEMLİDİR:

SMİLODON'un 5 °C altında ve 32 °C üstündeki sıcaklıklarda uygulanması tavsiye edilmez. Isı kontrolü gölgede yapılmalıdır. İlaçlama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye edilir. (Yapraklar ıslakken ilaçlama yapılmamalıdır.)

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SMİLODON kükürt, captan ve folpet aktif maddeleri içeren ilaçlar ile karışmaz. Şayet söz konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise SMİLODON uygulaması için 20 gün beklemek gerekmektedir. SMİLODON tek başına kullanılmalıdır.



Turunçgil Kırmızı Kabuklubiti
(*Aonidiella aurantii*)



Armut Psillidi (*Cacopsylla pyri*)



Dut Kabuklubiti
(*Pseudolacaspis pentagona*)



Kırmızı Örümcek
(*Tetranychus spp.*)



Ambalaj Şekli:
1 L * 20 adet
5 L * 4 adet
17 L * 1 adet

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA: SAFA TARIM A.Ş.



Büyükkayaçık Mahallesi 20 Nolu SokakNo: 31
Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com



UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi Tel: 114
Zehirlenme Durumlarında arayınız.)

Tavsiyelere Uygun Olarak Kullanınız.