

Mairol[®]
Green

Kortal[®]
Red

Tüm Gelişim Dönemlerinde Etkili
Mükemmel Bitki Besleyicileri

Mairol[®]

Kortal[®]

Daha İyi Verim İçin

SAFA TARIM[®]

İdeal gübre olarak Mairol® ve Hortal® bitkiler için gerekli tüm kimyasal bitki besin elementlerini içerir ve en etkili fiziksel özelliklere sahip ideal gübrelerdir.

Analiz	MAİROL	HORTAL
Azot (N)	14 %	6 %
Fosfor (P ₂ O ₅)	12 %	20 %
Potasyum (K ₂ O)	14%	30 %
Magnezyum (MgO)	3 %	3 %

Hortal ve Mairol Klor içermez. Her ikisinde de fosfor kaynağı olarak Orto-Fosfat kullanılmıştır.

İZ ELEMENTLER

Bor (Bor)	0,06%
Co (Kobalt)	0,002%
Cu (Bakır)	0,02%
Fe (Demir)	0,11%
Mn (Mangan)	0,090%
Mo (Molibden)	0,005%
Zn (Çinko)	0,007%

Kobalt, Bakır, Demir, Mangan ve Çinkonun tamamı EDTA ile Şelatlıdır.

Vitaminler ve Büyüme Hormonları
Thiamin(B1), Riboflavine (B2) Pyridoxol (Pyridoxine-B6), Nicotinamide, Naphthaleneacetic, Biotin (H), Aneurine, Lactoflavine

Yaprak uygulaması şeklinde uygulanan Mairol ve Hortal sağlıklı bitki gelişimi sağlar. hastalık ve iklimatik zararlanmalara karşı bitkileri korur. Ayrıca ağır stres şartlarının verdiği zararın atılmasını sağlar.

Mairol®

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE KULLANIM DOZLARI
Çeltik; 200 gram / da kardeşlenme döneminde kullanılmaktadır. 10-15 gün sonra aynı dozda ikinci uygulama yapılmalıdır.

Sebzeler (Sera ve Açık Tarla); (Domates, Patates, Patlıcan, Biber, Soğan, Salatalık, Kabak, Kavun, Karpuz, Havuç, Marul vs...). Gelişmenin erken dönemlerinde uygulamalara başlanmalıdır. 250 gr / 100 Lt suya ilave edilerek yapraklara püskürtülür ve 10-12 gün aralıklarla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Meyve Ağaçları; Sert Çekirdekli ve Yumuşak Çekirdekli, Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraktan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Bağ; Gelişmenin başlaması ile 250 gram / 100 litre suya ilave edilerek yapraklara püskürtülür. 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Turunçgiller; Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraktan kullanılır, 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Zeytin; Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram / 100 litre suya karıştırılarak yapraktan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Tarla Bitkileri; (Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Fasulye vs..) Gelişmenin erken dönemlerinde uygulamalara başlanmalıdır. 250 gr/da hesabıyla yapraklara püskürtülür ve 10-12 gün aralıklarla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Damlamadan; Dekara 2,5 kg olmak üzere 15 gün ara sezonda 2-3 uygulama yapılabilir, uygulama sayısı ihtiyaca göre artırılıp azaltılabilir.

Hortal®

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE KULLANIM DOZLARI
Çeltik; 250-300 gram / da kardeşlenme döneminde kullanılmaktadır. 10-15 gün sonra aynı dozda ikinci uygulama yapılmalıdır.

Sebzeler (Sera ve Açık Tarla) (Domates, Patates, Patlıcan, Biber, Salatalık, Kabak, Kavun, Karpuz, Havuç, Marul vs...) Gelişmenin erken dönemlerinde uygulamalara başlanmalıdır. 250-350 gr/100 Lt suya ilave edilerek yapraklara püskürtülür ve 10-12 gün aralıklarla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Meyve Ağaçları; (Sert çekirdekli ve Yumuşak Çekirdekli), Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraktan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Bağ; Gelişmenin başlaması ile 250 gram /100 litre suya ilave edilerek yapraklara püskürtülür. 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Turunçgiller; Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraktan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Zeytin; Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraktan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Fındık; Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraktan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Tarla Bitkileri; (Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Havuç, Fasulye vs...) Gelişmenin erken dönemlerinde uygulamalara başlanmalıdır. 200 gr/da hesabıyla yapraklara püskürtülür ve 10-12 gün aralıklarla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Damlamadan; Dekara 2,5 kg olmak üzere 15 gün ara sezonda 2-3 uygulama yapılabilir, uygulama sayısı ihtiyaca göre artırılıp azaltılabilir.



Mairol®

Manufacturer
Mairol GmbH & Co. KG
Danziger Strasse 3
89518 Heidenheim
Germany

Tescil Sahibi Firma: SAFA TARIM A.Ş.

SAFA TARIM

Büyükkayacık Mahallesi 20 Nolu Sokak No:31
Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332.239 14 60 - Fax: 0.332.239 14 66
Web: www.safatarim.com
E-mail: info@safatarim.com

Mairol®

Hortal®