

EC FERTİLİZER

Bakır (Cu-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 7
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 10,4

UYARILAR

- Asla uygun doz oralarını aşmayınız. Sadece Gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
- ÇOCUKLARDAN ve GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak/ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI: İthalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

KARIŞABİLİRLİK: Diğer bitki besleme ürünleri ve bitki koruma ürünleri ile karışımından emin olmak için ön karışım testi yapınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 / +40 °C arasındadır.

Bakanlık Tescil No:
Bakanlık Lisans No: 324
Net Ağırlık:

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:

İTHALATÇI FİRMA: SAFA TARIM A.Ş.

BÜYÜKKAYACIK MAH. 20 NOLU SOKAK, NO: 31
42250 KONYA – TÜRKİYE

ÜRETİCİ FİRMA: AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L.

Paraje Cerro De Los Lobos Edificio Maavi Innovation 04738 Vicar Almeria / İSPANYA



UYGULAMA ŞEKLİ ZAMANI VE MİKTARI

ÜRÜNLER	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU	UYGULAMA ZAMANI
Sebzeler	Yapraktan	50-150 g / 100 L su	Gelişim dönemi boyunca 2-4 uygulama
	Topraktan	150-350 g / da	
Narenciye	Yapraktan	250-300 g / 100 L su	Vejetatif büyüme döneminden hasat sonrası döneme kadar 1-3 uygulama
	Topraktan	150-350 g / da	
Meyve ağaçları, zeytin, bağ	Yapraktan	250-300 g / 100 L su	Vejetatif büyüme döneminden hasat sonrası döneme kadar 1-3 uygulama
	Topraktan	150-350 g / da	
Tarla Bitkileri	Yapraktan	100-150 g / da	Yeterli vejetatif gelişimden itibaren 1-4 uygulama
Süs Bitkileri	Yapraktan	50-150 g / 100 L su	Vejetatif büyüme döneminden hasat sonrası döneme kadar 1-3 uygulama
	Topraktan	150-350 g / da	
Çilek	Yapraktan	50-150 g / da	Vejetatif büyüme döneminden itibaren hasat dönemi boyunca 2-4 uygulama
	Topraktan	150-350 g / da	
Baklagiller	Yapraktan	50-150 g / da	Vejetatif büyüme döneminden itibaren hasat dönemi boyunca 2-4 uygulama
	Topraktan	150-350 g / da	
Patates	Yapraktan	50-150 g / da	Vejetatif büyüme döneminden itibaren hasat dönemine kadar
	Topraktan	150-350 g / da	

Tavsiyeler: Uygulama tankına eklemeyen önce 1-6 oranında (6 L'de 1 kg) suda ön seyreltme yapın.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

REV:01/ 16.12.2022

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık Mah. 20. Sok.
No: 31 Selçuklu / KONYA
Selçuk YD. 736 007 6546

Şirket Vekili
Burak Kişin